

Dépistage de la dénutrition chez l'adulte hospitalisé en CS ou SSR

Niveau 1
J1

➔ **IMC $\leq 18,5$ ***
et / ou ➔ **Perte de Poids :**
2% en 1 semaine
5% en 1 mois
10% en 6 mois

Personnels concernés :
➔ aide soignants
➔ infirmiers
➔ diététiciens
➔ médecins

Les flèches **rouges** indiquent l'action

Niveau 2
J2

STOP
▪ Poids 1x / s

NON

OUI

N.R.I : Index de Buzby *

> 97,5
Pas de dénutrition

STOP
▪ Poids 1x / s
▪ Surveillance alimentaire

83,5 à 97,5
Dénutrition modérée

< 83,5
Dénutrition sévère

Niveau 3

Facteurs aggravants
▪ Ingesta insuffisants
▪ Terrain, douleur
▪ Pathologies agressives
▪ Durée d'hospitalisation

Intervention diététique
Calcul des ingesta
Suppléments \pm N.A.
Mobiliser le patient
Pesée hebdomadaire

Discussion N.A.
Intervention de l'équipe de nutrition : PH et diététicien
N.A. dans le respect de l'éthique

* Utilisation du **Nutrimètre®** ; **N.A.** = Nutrition artificielle