

Dépistage de la dénutrition chez l'adulte en soins intensifs ou réanimation

Niveau 1
J1

➔ **IMC $\leq 18,5$ ***
 et / ou ➔ **Perte de Poids :**
 2% en 1 semaine
 5% en 1 mois
 10% en 6 mois
 et / ou ➔ **TTr < 110 mg/l**
 et / ou ➔ **CRP > 50 mg/l**

Personnels concernés:

- ➔ aide soignants
- ➔ infirmiers
- ➔ diététiciens
- ➔ médecins

Les flèches rouges indiquent l'action

Niveau 2
J2

STOP
▪ TTr 2 x / semaine

NON

OUI

N.R.I : Index de Buzby *

> 97,5
Pas de dénutrition

83,5 à 97,5
Dénutrition modérée

< 83,5
Dénutrition sévère

Niveau 3

TTr
mg/l

50 à 110

< à 50

Facteurs aggravants

- Sepsis
- Polytraumatisme
- Ingesta < 35 kcal/kg/j
- Acte alimentaire impossible

OUI

NON

Nutrition Artificielle
± Pharmaco-Nutriments

Surveillance Intervention
diététique ± NA

* Utilisation du Nutrimètre® ; TTr = Transthyrétine (mg/l) ; N.A. = Nutrition artificielle